



## **Baccalauréat des voies générale et technologique**



### **Mathématiques, série S**

#### **Exemples d'exercices, série S**

Les exercices donnés ici constituent des exemples, leur publication interdit que l'un quelconque d'entre eux fasse partie d'un sujet 2004.

20 novembre 2003

## Exercice n° 1 (enseignement obligatoire)


On considère 7 boules numérotées de 1 à 7. L'expérience consiste à en tirer simultanément 3.

1. Soit  $k$  un entier vérifiant  $3 \leq k \leq 7$ . Combien y a-t-il de tirages de 3 boules dont le plus grand numéro est  $k$  ?
  2. En déduire une expression de  $\sum_{k=3}^7 \binom{k-1}{2}$  sous forme d'un unique coefficient binomial.
- 

## Exercice n° 2 (enseignement obligatoire)

Le plan est rapporté à un repère orthonormal  $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ .

1. On désigne par  $\mathcal{C}$  la courbe représentative de la fonction exponentielle  $x \mapsto e^x$ . Pour tout point  $M$  d'abscisse  $t$  appartenant à  $\mathcal{C}$ , on considère le point  $P$  de coordonnées  $(t, 0)$  et le point  $N$ , point d'intersection de la tangente en  $M$  à  $\mathcal{C}$  avec l'axe des abscisses. Montrer que la distance  $PN$  est constante.



2. Dans la suite de l'exercice,  $f$  désigne une fonction définie sur  $\mathbf{R}$ , strictement positive, dérivable et dont la dérivée est strictement positive. Pour tout point  $M$  d'abscisse  $t$  appartenant à la courbe représentative de  $f$ , on considère le point  $P$  de coordonnées  $(t, 0)$  et le point  $N$ , point d'intersection de la tangente en  $M$  à la courbe représentative de  $f$  avec l'axe des abscisses.
    - (a) Calculer la distance  $PN$  en fonction de  $f(t)$  et de  $f'(t)$ .
    - (b) Déterminer une équation différentielle  $(E_k)$  vérifiée par les fonctions  $f$  définies sur  $\mathbf{R}$ , strictement positives, dérivables et dont la dérivée est strictement positive, pour lesquelles la distance  $PN$  est une constante  $k$ .
    - (c) Déterminer les fonctions  $f$  solutions de  $(E_k)$
-

### Exercice n° 3 (enseignement obligatoire)

À chaque question est affecté un certain nombre de points. Pour chaque question, une réponse exacte rapporte le nombre de points affecté; une réponse inexacte enlève la moitié du nombre de points affecté.

Le candidat peut décider de ne pas répondre à certaines de ces questions. Ces questions ne rapportent aucun point et n'en enlèvent aucun.

Si le total est négatif, la note est ramenée à 0.

Pour chaque question, une seule des 4 propositions est exacte. Le candidat doit cocher la case correspondante. Aucune justification n'est demandée.

1. Soit  $z \in \mathbf{C}$  vérifiant  $\bar{z} + |z| = 6 + 2i$ . L'écriture algébrique de  $z$  est :

$\frac{8}{3} - 2i$     
  $-\frac{8}{3} - 2i$     
  $\frac{8}{3} + 2i$     
  $-\frac{8}{3} + 2i$

2. Dans le plan complexe, l'ensemble des points  $M$  d'affixe  $z = x + iy$  vérifiant  $|z-1| = |z+i|$  est la droite d'équation :

$y = x - 1$     
  $y = -x$     
  $y = -x + 1$     
  $y = x$

3. Soit  $n$  un entier naturel. Le nombre  $(1 + i\sqrt{3})^n$  est réel si, et seulement si,  $n$  s'écrit sous la forme :

$3k + 1$     
  $3k + 2$     
  $3k$     
  $6k$

(avec  $k$  entier naturel)

4. Soit l'équation (E) :  $z = \frac{6-z}{3-z}$  ( $z \in \mathbf{C}$ ). Une solution de (E) est :

$-2 - \sqrt{2}i$     
  $2 + \sqrt{2}i$     
  $1 - i$     
  $-1 - i$

5. Soit deux points  $A$  et  $B$  d'affixes respectives  $z_A = i$  et  $z_B = \sqrt{3}$  dans un repère orthonormal  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ . L'affixe  $z_C$  du point  $C$  tel que  $ABC$  soit un triangle équilatéral avec  $(\vec{AB}, \vec{AC}) = \frac{\pi}{3}$  est :


$-i$     
  $2i$     
  $\sqrt{3} + i$     
  $\sqrt{3} + 2i$

6. Dans le plan complexe, l'ensemble des points  $M$  d'affixe  $z = x + iy$  vérifiant la relation  $\arg\left(\frac{z+2}{z-2i}\right) = \frac{\pi}{2}$  est inclus dans :

- La droite d'équation  $y = -x$   
 Le cercle de centre  $I(1+i)$  et de rayon  $R = \sqrt{2}$   
 La droite d'équation  $y = x$   
 Le cercle de diamètre  $[AB]$ ,  $A$  et  $B$  étant les points d'affixes respectives  $z_A = -2$  et  $z_B = 2i$ .
-

### Exercice n° 4 (enseignement obligatoire)

Soit  $f$  la fonction définie sur l'intervalle  $[0, 1]$  par  $f(x) = x - 2\sqrt{x} + 1$ . Cette fonction est dérivable sur  $]0, 1]$  et sa dérivée  $f'$  vérifie  $f'(1) = 0$ . La courbe représentative  $\Gamma$  de la fonction  $f$  dans un repère orthonormal est donnée ci-contre.



1. (a) Montrer que le point  $M$  de coordonnées  $(x, y)$  appartient à  $\Gamma$  si et seulement si  $x \geq 0$ ,  $y \geq 0$  et  $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ .
- (b) Montrer que  $\Gamma$  est symétrique par rapport à la droite d'équation  $y = x$ .
2. (a) Si  $\Gamma$  était un arc de cercle, quel pourrait être son centre? Quel pourrait être son rayon?
- (b) La courbe  $\Gamma$  est-elle un arc de cercle?

---


### Exercice n° 5 (enseignement obligatoire)

Le plan est rapporté à un repère orthonormal  $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ .

On note  $\Phi$  et  $\Gamma$  les courbes représentatives respectives des fonctions exponentielle et logarithme népérien.

Soit  $A$  le point de  $\Phi$  d'abscisse 0 et  $B$  le point de  $\Gamma$  d'abscisse 1.

1. (a) Écrire les équations de la tangente  $D$  à la courbe  $\Phi$  au point  $A$  et de la tangente  $\Delta$  à la courbe  $\Gamma$  au point  $B$ .
- (b) Montrer que les droites  $D$  et  $\Delta$  sont parallèles. Quelle est leur distance?
2. (a) Démontrer que la courbe  $\Phi$  est située entièrement « au-dessus » de  $D$ .
- (b) Démontrer que la courbe  $\Gamma$  est située entièrement « en dessous » de  $\Delta$ .
- (c) On désigne par  $M$  un point quelconque de  $\Phi$  et par  $N$  un point quelconque de  $\Gamma$ . Expliquer pourquoi  $MN \geq \sqrt{2}$ .




---

### Exercice n° 6 (enseignement obligatoire)

Le plan est rapporté à un repère orthonormal  $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ .

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbf{R}$  par :

$$f(x) = \frac{1}{2}e^{2x} - 2,1e^x + 1,1x + 1,6$$

1. Faire apparaître sur l'écran de la calculatrice graphique la courbe représentative de cette fonction dans la fenêtre  $-5 \leq x \leq 4, -4 \leq y \leq 4$ .  
Reproduire l'allure de la courbe obtenue sur la copie.
2. D'après cette représentation graphique, que pourrait-on conjecturer :
  - (a) Sur les variations de la fonction  $f$  ?
  - (b) Sur le nombre de solutions de l'équation  $f(x) = 0$  ?
3. On se propose maintenant d'étudier la fonction  $f$ .
  - (a) Résoudre dans  $\mathbf{R}$  l'inéquation  $e^{2x} - 2,1e^x + 1,1 \geq 0$ .
  - (b) Étudier les variations de la fonction  $f$ .
  - (c) Dédire de cette étude le nombre de solutions de l'équation  $f(x) = 0$ .
4. On veut représenter, sur l'écran d'une calculatrice, la courbe représentative de la fonction  $f$  sur l'intervalle  $[-0,05 ; 0,15]$ , de façon à visualiser les résultats de la question 3.  
Quelles valeurs extrêmes de l'ordonnée  $y$  peut-on choisir pour la fenêtre de la calculatrice ?

### Exercice n° 7 (enseignement obligatoire)

*NB* : Les quatre propositions peuvent être examinées indépendamment les unes des autres.

On considère une suite  $(u_n)$  positive et la suite  $(v_n)$  définie par  $v_n = \frac{u_n}{1 + u_n}$ .

Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier dans chaque cas.

1. Pour tout  $n, 0 \leq v_n \leq 1$ .
2. Si la suite  $(u_n)$  est convergente, alors la suite  $(v_n)$  est convergente.
3. Si la suite  $(u_n)$  est croissante, alors la suite  $(v_n)$  est croissante.
4. Si la suite  $(v_n)$  est convergente, alors la suite  $(u_n)$  est convergente.

## Exercice n° 8 (enseignement obligatoire)

Dans cet exercice, les questions sont indépendantes.

Pour chaque question, une seule des trois propositions a), b) ou c) est exacte. On demande d'indiquer laquelle, sans justification.

À chaque question est affecté un certain nombre de points. Pour chaque question, une réponse exacte rapporte le nombre de points affecté; une réponse inexacte enlève la moitié du nombre de points affecté.

Le candidat peut décider de ne pas répondre à certaines de ces questions. Ces questions ne rapportent aucun point et n'en enlèvent aucun.

Si le total est négatif, la note est ramenée à 0.

L'espace est rapporté à un repère orthonormal  $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ .

1. Soient  $A$  et  $B$  deux points distincts de l'espace.

L'ensemble des points  $M$  de l'espace tels que  $\|\overrightarrow{MA}\| = \|\overrightarrow{MB}\|$  est :

- a) l'ensemble vide      b) un plan      c) une sphère

2. On considère les points  $E(0; 1; -2)$  et  $F(2; 1; 0)$ .

Les coordonnées du barycentre  $G$  de  $(E; 1)$  et  $(F; 3)$  sont :

- a)  $G(6; 4; -2)$       b)  $G(1,5; 1; -0,5)$       c)  $G(0,5; 1; 1,5)$

3. Soit  $d$  la droite de représentation paramétrique  $x = 2 - t; y = 3t; z = -3, \quad t \in \mathbf{R}$ .

On considère les points  $A(2; 3; -3), B(2; 0; -3)$  et  $C(0; 6; 0)$ . On a :

- a)  $d = (AB)$       b)  $d = (BC)$       c)  $d \neq (AB)$  et  $d \neq (BC)$  et  $d \neq (CA)$

4. Les droites de représentations paramétriques respectives

$$x = 2 + t; y = 1 - t; z = 1 + t, \quad t \in \mathbf{R},$$

$$x = -t'; y = -2 - 1,5t'; z = 3 + t', \quad t' \in \mathbf{R}$$

admettent comme point commun :

- a)  $I(3; 0; 2)$       b)  $J(2; 1; 1)$       c)  $K(0; 2; -3)$

5. Les droites de représentations paramétriques respectives :

$$x = 1; y = 1 + 2t; z = 1 + t, \quad t \in \mathbf{R},$$

$$x = 3 - 2t'; y = 7 - 4t'; z = 2 - t', \quad t' \in \mathbf{R}$$

sont :

- a) parallèles      b) sécantes      c) non coplanaires

6. La droite de représentation paramétrique  $x = -4t; y = 1 + 3t; z = 2 + 2t, \quad t \in \mathbf{R}$  et le plan d'équation  $x - 2y + 5z - 1 = 0$  sont :

- a) orthogonaux      b) parallèles      c) ni orthogonaux ni parallèles

7. L'ensemble des points tels que  $x - y + 2z - 1 = 0$  et  $-2x + 4y - 4z + 1 = 0$  est :

- a) l'ensemble vide      b) une droite      c) un plan

### Exercice n° 9 (enseignement obligatoire)

- Étudier les variations de la fonction  $f$  définie sur  $\mathbf{R}$  par  $f(x) = \cos x + x$ .  
En déduire que l'équation  $\cos x + x = 0$  a une unique solution. En donner une valeur approchée à  $10^{-3}$  près.
- On considère l'équation (E)  $\sin x - \frac{x}{2} = 0, \quad x \in \mathbf{R}$ .
  - Montrer que toutes les solutions de cette équation appartiennent à l'intervalle  $[-2, 2]$ .
  - Donner, en le justifiant, le nombre de solutions de l'équation (E).
  - Donner une valeur approchée, à  $10^{-3}$  près par défaut, de la plus grande solution.

### Exercice n° 10 (spécialité)

L'exercice propose cinq affirmations numérotées de 1 à 5.

Pour chacune de ces affirmations, dire si elle est vraie ou si elle est fausse, **en justifiant le choix effectué**.

- Si un nombre est divisible par 4, alors il est divisible par 8.
- Si un nombre est divisible par 2 et par 3, alors il est divisible par 6.
- Si un nombre est divisible par 4 et par 6, alors il est divisible par 24.
- Si deux entiers  $a$  et  $b$  sont premiers entre eux, alors les entiers  $a + b$  et  $a - b$  sont premiers entre eux.
- Si deux entiers  $a$  et  $b$  sont premiers entre eux, alors les entiers  $2a + b$  et  $3a + 2b$  sont premiers entre eux.

### Exercice n° 11 (enseignement obligatoire)

L'espace est rapporté à un repère orthonormal  $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ .

- Déterminer une équation du plan  $P$  passant par le point  $A(1, 0, 1)$  et de vecteur normal  $\vec{n} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ .
- Soit  $P'$  le plan d'équation  $x + 2y - z + 1 = 0$  et  $M$  le point de coordonnées  $(0, 1, 1)$ .
  - Sachant que deux plans sont perpendiculaires si un vecteur non nul normal à l'un est orthogonal à un vecteur non nul normal à l'autre, démontrer que les plans  $P$  et  $P'$  sont perpendiculaires.
  - Calculer les distances  $d$  et  $d'$  du point  $M$  aux plans  $P$  et  $P'$  respectivement.
- Donner une représentation paramétrique de la droite  $D$  intersection des plans  $P$  et  $P'$ .
  - Déterminer les coordonnées du point  $H$  de  $D$  tel que la droite  $(MH)$  soit perpendiculaire à la droite  $D$ .
  - Vérifier que  $MH^2 = d^2 + d'^2$ .

## Exercice n° 12 (enseignement obligatoire)

Le plan est rapporté à un repère orthonormal  $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ .


On note  $I$  le point de coordonnées  $(1, 0)$ .

Soient  $f$  la fonction définie sur l'intervalle  $[0, 1]$  par  $f(x) = e^{x-1}$  et  $\mathcal{C}$  sa courbe représentative dans le repère  $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ .

On note  $\Delta$  la portion de plan comprise entre la courbe  $\mathcal{C}$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x = 0$  et  $x = 1$ .

Le but de l'exercice est de prouver l'existence d'un unique réel  $\alpha$  appartenant à l'intervalle  $[0, 1]$  tel que, si  $A$  est le point de  $\mathcal{C}$  d'abscisse  $\alpha$ , le segment  $[IA]$  partage  $\Delta$  en deux régions de même aire.

Pour tout  $x$  appartenant à l'intervalle  $[0, 1]$ , on note  $M_x$  le point de coordonnées  $(x, f(x))$  et  $T_x$  le domaine délimité par la droite  $(IM_x)$ , l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la courbe  $\mathcal{C}$ . On désigne par  $g(x)$  l'aire de  $T_x$ .



1. Pour tout  $x$  appartenant à l'intervalle  $[0, 1]$ , calculer  $g(x)$  en fonction de  $x$ .
2. Étudier les variations de la fonction  $g : x \mapsto g(x)$  sur  $[0, 1]$ .
3. (a) Par des considérations d'aires, montrer que  $g(0) \leq \frac{1}{2} \int_0^1 f(t) dt$ .  
 (b) Montrer qu'il existe un unique réel  $\alpha$  de  $[0, 1]$  tel que  $g(\alpha)$  soit égal à la moitié de l'aire de  $\Delta$ .
4. Trouver une valeur approchée de  $\alpha$  à  $10^{-3}$  près par défaut.



### Exercice n° 13 (enseignement obligatoire)

Le plan est rapporté à un repère orthonormal  $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ .


On note  $I$  le point de coordonnées  $(1, 0)$ .

Soient  $f$  une fonction positive, strictement croissante et dérivable sur  $[0, 1]$ ,  $\mathcal{C}$  sa courbe représentative dans le repère  $(O ; \vec{i}, \vec{j})$  et  $\Delta$  la portion de plan comprise entre  $\mathcal{C}$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x = 0$  et  $x = 1$ .

Le but du problème est de prouver l'existence d'un unique réel  $\alpha$  appartenant à l'intervalle  $[0, 1]$  tel que, si  $A$  est le point de  $\mathcal{C}$  d'abscisse  $\alpha$ , le segment  $[IA]$  partage  $\Delta$  en deux régions de même aire.

Pour tout  $x$  appartenant à l'intervalle  $[0, 1]$ , on note  $M_x$  le point de coordonnées  $(x, f(x))$  et  $T_x$  le domaine délimité par la droite  $(IM_x)$ , l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la courbe  $\mathcal{C}$ .

On désigne par  $F$  la fonction définie sur  $[0, 1]$  par  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$  et par  $g(x)$  l'aire de  $T_x$ .



1. Exprimer, pour tout  $x$  appartenant à l'intervalle  $[0, 1]$ ,  $g(x)$  en fonction de  $x$ ,  $f(x)$  et  $F(x)$ .
2. **Démonstration de cours.** Démontrer que  $F$  est dérivable et a pour dérivée  $f$ .
3. Étudier les variations de la fonction  $g : x \mapsto g(x)$  sur  $[0, 1]$ .
4. (a) Par des considérations d'aires, montrer que  $g(0) \leq \frac{1}{2} \int_0^1 f(t) dt$ .  
 (b) Montrer qu'il existe un unique réel  $\alpha$  de  $[0, 1]$  tel que  $g(\alpha)$  soit égal à la moitié de l'aire de  $\Delta$ .

**Exercice n° 14 (enseignement obligatoire)**

A. Solutions d'une équation différentielle.

On considère l'équation différentielle :

$$(\mathcal{A}) \quad y' = -10y + 6$$

où  $y$  désigne une fonction de la variable  $t$ , dérivable sur  $\mathbf{R}$ .

1. **Démonstration de cours.** Démontrer l'existence et l'unicité de la solution  $f$  de l'équation différentielle  $(\mathcal{A})$  telle  $f(0) = 0$ .
2. Vérifier que la solution  $f$  de l'équation différentielle  $(\mathcal{A})$  telle que  $f(0) = 0$  est  $f : t \mapsto \frac{3}{5}(1 - e^{-10t})$ .

B. Établissement d'un courant dans une bobine.

Aux bornes d'une bobine de résistance  $R$  (exprimée en ohms) et d'inductance  $L$  (exprimée en henrys), on branche, à la date  $t = 0$ , un générateur de force électromotrice  $E$  (exprimée en volts). L'unité de temps est la seconde.

L'intensité du courant dans le circuit (exprimée en ampères) est une fonction dérivable du temps, notée  $i$ . À la date  $t = 0$  l'intensité est nulle.

Au cours de l'établissement du courant, la fonction  $i$  est solution de l'équation différentielle :

$$Li' + Ri = E$$

*Valeurs numériques.* Dans toute la suite, on prend  $R = 5$ ,  $L = \frac{1}{2}$ ,  $E = 3$ .

1. Dédire des questions précédentes l'expression de  $i(t)$  pour  $t \geq 0$ .
  2. Déterminer  $\lim_{t \rightarrow +\infty} i(t)$ .
-

### Exercice n° 15 (enseignement obligatoire)

Soit  $I$  l'intervalle  $[0, 1]$ . On considère la fonction  $f$  définie sur  $I$  par  $f(x) = \frac{3x + 2}{x + 4}$ .

1. Étudier les variations de  $f$  et en déduire que, pour tout  $x$  élément de  $I$ ,  $f(x)$  appartient à  $I$ .
2. On considère la suite  $(u_n)$  définie par

$$u_0 = 0 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = \frac{3u_n + 2}{u_n + 4}.$$

Montrer que, pour tout  $n$ ,  $u_n$  appartient à  $I$ .

On se propose d'étudier la suite  $(u_n)$  par deux méthodes différentes.

**Première méthode :**

3. (a) Représenter graphiquement  $f$  dans un repère orthonormal d'unité graphique 10 cm.
- (b) En utilisant le graphique précédent, placer les points  $A_0, A_1, A_2$  et  $A_3$  d'ordonnée nulle et d'abscisses respectives  $u_0, u_1, u_2$  et  $u_3$ .  
Que suggère le graphique concernant le sens de variation de  $(u_n)$  et sa convergence ?
- (c) Établir la relation  $u_{n+1} - u_n = \frac{(1 - u_n)(u_n + 2)}{u_n + 4}$  et en déduire le sens de variation de la suite  $(u_n)$ .
- (d) Démontrer que la suite  $(u_n)$  est convergente.
- (e) Prouver que la limite  $\ell$  de la suite  $(u_n)$  vérifie  $\ell = f(\ell)$  et calculer  $\ell$ .

**Deuxième méthode :**

On considère la suite  $(v_n)$  définie par  $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 2}$ .

4. (a) Prouver que  $(v_n)$  est une suite géométrique de raison  $\frac{2}{5}$ .
  - (b) Calculer  $v_0$  et exprimer  $v_n$  en fonction de  $n$ .
  - (c) Exprimer  $u_n$  en fonction de  $v_n$ , puis en fonction de  $n$ .
  - (d) En déduire la convergence de la suite  $(u_n)$  et sa limite.
-

**Exercice n° 16 (enseignement obligatoire)**

Dans l'espace muni du repère orthonormal  $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ , on considère les points :

$$A(2, 0, 0), \quad B(-1, \sqrt{3}, 0) \quad \text{et} \quad C(-1, -\sqrt{3}, 0)$$

1. Placer sur une figure les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  dans le plan  $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ .
2. Montrer que le triangle  $ABC$  est équilatéral et que  $O$  est son centre.
3. (a) Déterminer l'ensemble des points  $M$  de l'espace équidistants des points  $A$  et  $B$ .  
(b) Déterminer l'ensemble des points  $N$  de l'espace équidistants des points  $B$  et  $C$ .  
(c) En déduire que l'ensemble des points  $P$  de l'espace équidistants des points  $A$ ,  $B$  et  $C$  est l'axe  $(O ; \vec{k})$ .
4. Montrer qu'il existe un unique point  $D$  dont la troisième coordonnée est positive tel que le tétraèdre  $ABCD$  soit régulier et calculer ses coordonnées.
5. Soit  $M$  un point quelconque du segment  $[CD]$ . On pose  $\overrightarrow{CM} = \lambda \overrightarrow{CD}$  avec  $\lambda \in [0, 1]$ .

(a) Montrer que  $\cos \widehat{AMB} = \frac{2\lambda^2 - 2\lambda + 1}{2(\lambda^2 - \lambda + 1)}$ .

On définit une fonction  $f$  de  $\mathbf{R}$  dans  $\mathbf{R}$  par la relation


$$f(\lambda) = \frac{2\lambda^2 - 2\lambda + 1}{2(\lambda^2 - \lambda + 1)} = 1 - \frac{1}{2(\lambda^2 - \lambda + 1)}.$$

- (b) Étudier les variations de la fonction  $f$ .
- (c) En déduire la position de  $M$  pour laquelle l'angle  $\widehat{AMB}$  est maximum.
- (d) Quelle est la valeur de ce maximum ?
-

### Exercice n° 17 (spécialité)

#### PARTIE I

Soit  $ABC$  un triangle rectangle en  $B$ , direct :  
 $(\vec{BC}, \vec{BA}) = \frac{\pi}{2}$ .



Soit  $E$  un point du segment  $[AB]$ . Par le point  $E$  on mène une droite  $d$  qui coupe le segment  $[AC]$  en un point  $F$  et la droite  $(BC)$  en un point  $G$  (voir figure ci-contre). On suppose que les points  $E, F, G$  sont distincts des points  $A, B, C$ .

Le cercle  $\Gamma$  circonscrit au triangle  $ABC$  et le cercle  $\Gamma'$  circonscrit au triangle  $BEG$  se coupent en deux points distincts  $B$  et  $K$ .

1. Justifier l'existence d'une similitude plane directe  $S$  telle que  $S(A) = C$  et  $S(E) = G$ . Déterminer l'angle de  $S$ .
2. Soit  $\Omega$  le centre de  $S$ .
  - (a) Montrer que  $\Omega$  appartient aux cercles  $\Gamma$  et  $\Gamma'$ .
  - (b) Prouver que  $\Omega$  est différent de  $B$ .
  - (c) Que peut-on en déduire pour  $\Omega$ ?

#### PARTIE II

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct  $(O ; \vec{u}, \vec{v})$  d'unité graphique 2 cm. Les affixes respectives des points  $A, B, C, E, F$  et  $G$  sont données par :

$$z_A = 2 + 4i, \quad z_B = -1 - 2i, \quad z_C = 3 - 4i, \quad z_E = 0, \quad z_F = \frac{5}{2}, \quad z_G = -5.$$

On admettra que le point  $F$  est le point d'intersection du segment  $[AC]$  et de la droite  $(GE)$  et que les conditions de la partie I sont vérifiées.

1. Placer ces points sur une figure et, à l'aide des résultats de la partie I, construire le point  $\Omega$ , centre de la similitude  $S$ .
2. Soit  $S'$  la similitude plane directe telle que  $S'(A) = E$  et  $S'(C) = G$ . Déterminer l'écriture complexe de  $S'$  et déterminer l'abscisse du centre  $\Omega'$  de  $S'$ .
3. Montrer que les points  $\Omega$  et  $\Omega'$  sont confondus.

---

## Exercice n° 18 (enseignement obligatoire)

On sait tous qu'il y a des années à coccinelles et d'autres sans !

On se propose d'étudier l'évolution d'une population de coccinelles à l'aide d'un modèle utilisant la fonction numérique  $f$  définie par  $f(x) = kx(1 - x)$ ,  $k$  étant un paramètre qui dépend de l'environnement ( $k \in \mathbf{R}$ ).

Dans le modèle choisi, on admet que le nombre des coccinelles reste inférieur à un million. L'effectif des coccinelles, exprimé en millions d'individus, est approché pour l'année  $n$  par un nombre réel  $u_n$ , avec  $u_n$  compris entre 0 et 1. Par exemple, si pour l'année zéro il y a 300 000 coccinelles, on prendra  $u_0 = 0,3$ .

On admet que l'évolution d'une année sur l'autre obéit à la relation  $u_{n+1} = f(u_n)$ ,  $f$  étant la fonction définie ci-dessus.

Le but de l'exercice est d'étudier le comportement de la suite  $(u_n)$  pour différentes valeurs de la population initiale  $u_0$  et du paramètre  $k$ .


1. Démontrer que si la suite  $(u_n)$  converge, alors sa limite  $\ell$  vérifie la relation  $f(\ell) = \ell$ .
2. Supposons  $u_0 = 0,4$  et  $k = 1$ .
  - (a) Étudier le sens de variation de la suite  $(u_n)$ .
  - (b) Montrer par récurrence que, pour tout entier  $n$ ,  $0 \leq u_n \leq 1$ .
  - (c) La suite  $(u_n)$  est-elle convergente ? Si oui, quelle est sa limite ?
  - (d) Que peut-on dire de l'évolution à long terme de la population de coccinelles avec ces hypothèses ?
3. Supposons maintenant  $u_0 = 0,3$  et  $k = 1,8$ .
  - (a) Étudier les variations de la fonction  $f$  sur  $[0, 1]$  et montrer que  $f\left(\frac{1}{2}\right) \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$ .
  - (b) En utilisant éventuellement un raisonnement par récurrence,
    - montrer que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $0 \leq u_n \leq \frac{1}{2}$  ;
    - établir que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_{n+1} \geq u_n$ .
  - (c) La suite  $(u_n)$  est-elle convergente ? Si oui, quelle est sa limite ?
  - (d) Que peut-on dire de l'évolution à long terme de la population de coccinelles avec ces hypothèses ?
4. On a représenté sur les feuilles annexes la fonction  $f$  dans les deux cas étudiés ci-dessus ainsi que la droite d'équation  $y = x$ . Le troisième graphique correspond au cas où  $u_0 = 0,8$  et  $k = 3,2$ .

Illustrer sur les deux premiers graphiques les résultats trouvés en 1. et 2. en laissant les traits de construction et en faisant apparaître en abscisse les valeurs successives  $u_0, u_1, u_2, \dots$ .


En utilisant la même méthode, formuler une conjecture sur l'évolution de la population dans le troisième cas.

### Feuilles annexes


1<sup>er</sup> cas :  $u_0 = 0,4$  et  $k = 1$ .



2<sup>e</sup> cas :  $u_0 = 0,3$  et  $k = 1,8$ .



**3<sup>e</sup> cas :**  $u_0 = 0,8$  et  $k = 3,2$ .






### Exercice n° 19 (enseignement obligatoire)

Soit  $ABCDEFGH$  un cube de côté 1. On choisit le repère orthonormal  $(A; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ , avec  $\vec{i} = \overrightarrow{AB}$ ,  $\vec{j} = \overrightarrow{AD}$  et  $\vec{k} = \overrightarrow{AE}$ .

On appelle  $I, J, K, L, M$  et  $N$  les milieux respectifs des segments  $[BC]$ ,  $[CD]$ ,  $[DH]$ ,  $[HE]$ ,  $[EF]$  et  $[FB]$ .




- Déterminer les coordonnées des points  $I, K, M$ .
- Montrer que les six points  $I, J, K, L, M$  et  $N$  sont coplanaires, dans un plan que l'on notera  $\mathcal{P}$  (on donnera une équation du plan  $\mathcal{P}$  dans le repère choisi).
- Montrer que le vecteur  $\overrightarrow{AG}$  est un vecteur normal au plan  $\mathcal{P}$ .
- Montrer que les projetés orthogonaux des points  $I, J, K, L, M$  et  $N$  sur la droite  $(AG)$  sont confondus en un même point. On appellera  $T$  ce point.  
Déterminer la position du point  $T$  sur le segment  $[AG]$ .
- Montrer que  $IJKLMN$  est un hexagone inscritible dans un cercle dont on précisera le centre et le rayon et montrer que tous ses côtés ont même longueur.
- On considère la pyramide ayant pour base cet hexagone et pour sommet le point  $G$ .  
Quelle fraction du volume du cube représente le volume de cette pyramide?

**Exercice n° 20 (enseignement obligatoire)**

Les questions sont indépendantes. Il est demandé de justifier toutes les réponses fournies.

1. Dans chacun des cas suivants, proposer une fonction  $f$  qui vérifie les propriétés données. On donnera l'expression de  $f(x)$ .
  - (a)  $f$  est définie sur  $\mathbf{R}$  par  $f(x) = ae^{2x} + be^x + c$ , la limite de  $f$  en  $+\infty$  est  $+\infty$  et l'équation  $f(x) = 0$  admet deux solutions, 0 et  $\ln 2$ .
  - (b)  $f$  est définie sur  $]0, +\infty[$ ,  $f(2) = 4$  et, pour tout  $x$  et tout  $y$  réels strictement positifs,  $f(xy) = f(x) + f(y)$ .
  - (c)  $f$  est une fonction polynôme de degré supérieur ou égal à 2 et la valeur moyenne de  $f$  sur  $[-2, 2]$  est 0.
2. Soit  $g$  une fonction définie et dérivable, de dérivée  $g'$  continue sur  $[-1, 1]$ . La courbe représentative de  $g$  est donnée ci-dessous.



Les affirmations suivantes sont-elles cohérentes avec le schéma :

- (a)  $\int_0^1 g'(x) dx = 0$  ?
- (b)  $\int_0^1 g(x) dx > -\frac{1}{2}$  ?

---

## Exercice n° 21 (enseignement obligatoire)

Cet exercice se présente comme un questionnaire à choix multiples (QCM). Les quatre questions sont indépendantes.

Pour chaque question il y a deux conclusions correctes. Le candidat doit cocher **au plus deux cases** (celles qu'il juge correctes). Aucune justification n'est demandée.

À chaque question est affecté un certain nombre de points. Chaque réponse exacte rapporte la moitié des points affectés ; chaque réponse fausse enlève le quart des points affectés. Cocher trois cases ou plus à une question, ou n'en cocher aucune, rapporte zéro point à cette question. Si, par application de ce barème, le total des points de l'exercice est négatif, il est ramené à zéro.

On considère trois suites  $(u_n)$ ,  $(v_n)$  et  $(w_n)$  qui vérifient la propriété suivante :

« Pour tout entier naturel  $n$  strictement positif :  $u_n \leq v_n \leq w_n$  ».

1. Si la suite  $(v_n)$  tend vers  $-\infty$ , alors :
    - La suite  $(w_n)$  tend vers  $-\infty$
    - la suite  $(u_n)$  est majorée
    - la suite  $(u_n)$  tend vers  $-\infty$
    - la suite  $(w_n)$  n'a pas de limite.
  2. Si  $u_n \geq 1$ ,  $w_n = 2u_n$  et  $\lim(u_n) = \ell$ , alors :
    - $\lim (v_n) = \ell$
    - La suite  $(w_n)$  tend vers  $+\infty$
    - $\lim (w_n - u_n) = \ell$
    - On ne sait pas dire si la suite  $(v_n)$  a une limite ou non.
  3. Si  $\lim (u_n) = -2$  et  $\lim (w_n) = 2$ , alors :
    - La suite  $(v_n)$  est majorée
    - $\lim (v_n) = 0$
    - la suite  $(v_n)$  n'a pas de limite
    - On ne sait pas dire si la suite  $(v_n)$  a une limite ou non.
  4. Si  $u_n = \frac{2n^2 - 1}{n^2}$  et  $w_n = \frac{2n^2 + 3}{n^2}$ , alors :
    - $\lim (w_n) = 0$
    - $\lim (v_n) = 2$
    - $\lim (u_n) = 2$
    - la suite  $(v_n)$  n'a pas de limite.
-

## Exercice n° 22 (enseignement obligatoire)

### Partie A

On considère la fonction numérique  $f$  de la variable réelle  $x$  définie sur l'intervalle  $]0, +\infty[$  par

$$f(x) = \sqrt{x} e^{1-x}$$

Elle est dérivable sur l'intervalle  $]0, +\infty[$ . On note  $f'$  sa dérivée.

On note  $\mathcal{C}$  la courbe représentative de  $f$  dans le plan rapporté à un repère orthonormal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1. **Démonstration de cours.** Déterminer la limite en  $+\infty$  de la fonction  $x \mapsto \frac{e^x}{x}$ .
2. Déterminer la limite de  $f$  en  $+\infty$  (on pourra pour cela justifier et exploiter l'écriture, pour tout  $x$  réel strictement positif,  $f(x) = \frac{e}{\sqrt{x}} \times \frac{x}{e^x}$ ).  
Interpréter graphiquement le résultat.
3. Pour  $x$  élément de  $]0, +\infty[$ , calculer  $f'(x)$ .
4. Dédire des questions précédentes le tableau de variation de  $f$ .
5. Tracer la courbe  $\mathcal{C}$  (unité graphique : 2 cm).

### Partie B

On considère la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  non nul par  $u_n = \int_n^{n+1} f(t) dt$ .

1. Interpréter géométriquement  $u_n$ .
2. Démontrer que, pour tout entier naturel  $n$  non nul,  $f(n+1) \leq u_n \leq f(n)$ .
3. En déduire que la suite  $(u_n)$  est décroissante.
4. Prouver la convergence de la suite  $(u_n)$  et déterminer sa limite.

### Partie C

On considère la fonction numérique  $F$  de la variable réelle  $x$  définie sur  $[1, +\infty[$  par

$$F(x) = \int_1^x f(t) dt$$

1. (a) Montrer que  $F$  est dérivable sur  $[1, +\infty[$  et calculer  $F'(x)$ .  
(b) En déduire le sens de variation de  $F$ .
2. (a) Démontrer que, pour tout réel  $t$  positif,  $t + 2 \geq 2\sqrt{2}\sqrt{t}$ .  
(b) En déduire que, pour tout  $x$  de l'intervalle  $[1, +\infty[$ ,  $F(x) \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_1^x (t+2)e^{1-t} dt$ .  
(c) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que, pour tout  $x$  appartenant à  $[1, +\infty[$ ,


$$\int_1^x (t+2)e^{1-t} dt = 4 - (x+3)e^{1-x}$$

- (d) En déduire que, pour tout  $x$  appartenant à  $[1, +\infty[$ ,  $0 \leq F(x) \leq \sqrt{2}$ .
3. On note, pour tout entier naturel  $n$  non nul,  $S_n$  la somme des  $n-1$  premiers termes de la suite  $(u_n)$ . Exprimer  $S_n$  à l'aide d'une intégrale. Montrer que la suite  $(S_n)$  converge et donner un encadrement de sa limite.

### Exercice n° 23 (enseignement obligatoire)

On considère un cube  $ABCDEFGH$ , d'arête de longueur  $a$  ( $a$  réel strictement positif).

Soit  $I$  le point d'intersection de la droite  $(EC)$  et du plan  $(AFH)$ .



- Calculer, en fonction de  $a$ , les produits scalaires suivants :

$$\vec{EA} \cdot \vec{AF}, \vec{AB} \cdot \vec{AF}, \vec{BC} \cdot \vec{AF}$$

- En déduire que les vecteurs  $\vec{EC}$  et  $\vec{AF}$  sont orthogonaux.

On admettra de même que les vecteurs  $\vec{EC}$  et  $\vec{AH}$  sont orthogonaux.

- En déduire que le point  $I$  est le projeté orthogonal de  $E$  sur le plan  $(AFH)$ .

- Justifier les résultats suivants : les droites  $(AF)$  et  $(EH)$  sont orthogonales, ainsi que les droites  $(AF)$  et  $(EI)$ .
  - En déduire que la droite  $(AF)$  est orthogonale à la droite  $(HI)$ .
  - Établir de même que la droite  $(AH)$  est orthogonale à la droite  $(FI)$ .
- Que représente le point  $I$  pour le triangle  $AFH$  ?

### Exercice n° 24 (enseignement obligatoire)

L'espace est rapporté à un repère orthonormal  $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ .

On considère les points  $A, B, C$  et  $S$  de coordonnées respectives :

$$A(-1, 0, 1) \quad B(1, 4, -1) \quad C(3, -4, -3) \quad S(4, 0, 4)$$

- Démontrer que le triangle  $ABC$  est un triangle rectangle en  $A$ .
- Montrer que le vecteur  $\vec{SO}$  est orthogonal aux vecteurs  $\vec{AB}$  et  $\vec{AC}$ .
  - En déduire une équation cartésienne du plan  $(ABC)$ .
- Démontrer que  $O$  est le barycentre des points  $A, B, C$  affectés de coefficients que l'on déterminera.
  - En déduire que  $O$  est situé dans le triangle  $ABC$ .
- Calculer le volume  $V$  du tétraèdre  $SABC$ .

## Exercice n° 25 (enseignement obligatoire)

On se propose d'étudier les fonctions  $f$  dérivables sur  $[0, +\infty[$  vérifiant la condition

$$(1) \begin{cases} \text{pour tout } x \in [0, +\infty[, f(x)f'(x) = 1 \\ f(0) = 1 \end{cases}$$

### Partie A

On suppose qu'il existe une fonction  $f$  qui vérifie (1).

La méthode d'EULER permet de construire une suite de points  $(M_n)$  proches de la courbe représentative de la fonction  $f$ . On choisit le pas  $h = 0,1$ .

On admet que les coordonnées  $(x_n, y_n)$  des points  $M_n$  obtenus en appliquant cette méthode avec ce pas vérifient :

$$\begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 1 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} x_{n+1} = x_n + 0,1 \\ y_{n+1} = y_n + \frac{0,1}{y_n} \end{cases} \quad \text{pour tout entier naturel } n.$$

Calculer les coordonnées des points  $M_1, M_2, M_3, M_4, M_5$  (on arrondira au millièmes les valeurs trouvées).

### Partie B

On se propose de démontrer qu'une fonction vérifiant (1) est nécessairement strictement positive sur  $[0, +\infty[$ .

1. Montrer que si la fonction  $f$  vérifie (1) alors  $f$  ne s'annule pas sur  $[0, +\infty[$ .
2. On suppose que la fonction  $f$  vérifie la condition (1) et qu'il existe un réel  $a$  strictement positif tel que  $f(a) < 0$ .  
En déduire que l'équation  $f(x) = 0$  admet au moins une solution dans l'intervalle  $[0, a]$ .
3. Conclure.

### Partie C

*Existence et unicité de la fonction  $f$ .*

1. Soit  $u$  une fonction dérivable sur un intervalle  $I$ . Déterminer une primitive de la fonction  $uu'$  sur cet intervalle.
2. En déduire que si  $f$  est telle que,

$$\text{pour tout } x \in [0, +\infty[, f(x)f'(x) = 1,$$

alors il existe une constante  $C$  telle que :

$$\text{pour tout } x \in [0, +\infty[, (f(x))^2 = 2x + C.$$

3. On rappelle que  $f(0) = 1$ . Déterminer l'expression de  $f(x)$  pour  $x$  réel positif.
4. En déduire les valeurs arrondies au millièmes de  $f(0,1), f(0,2), f(0,3), f(0,4), f(0,5)$ , puis les comparer avec les valeurs obtenues par la méthode d'EULER.

## Exercice n° 26 (spécialité)

*Cet exercice, trop long pour un exercice de spécialité, est présenté dans son intégralité pour respecter sa cohérence ainsi que le travail de l'auteur.*

1. (a) Déterminer deux entiers relatifs  $u$  et  $v$  tels que  $7u - 13v = 1$ .  
 (b) En déduire deux entiers relatifs  $u_0$  et  $v_0$  tels que  $14u_0 - 26v_0 = 4$ .  
 (c) Déterminer tous les couples  $(a, k)$  d'entiers relatifs tels que  $14a - 26k = 4$ .
2. On considère deux entiers naturels  $a$  et  $b$ . Pour tout entier  $n$ , on note  $\varphi(n)$  le reste de la division euclidienne de  $an + b$  par 26.

On décide de coder un message, en procédant comme suit :

À chaque lettre de l'alphabet on associe un entier compris entre 0 et 25, selon le tableau :

Lettre	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Nombre	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lettre	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Nombre	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Pour chaque lettre  $\alpha$  du message, on détermine l'entier  $n$  associé puis on calcule  $\varphi(n)$ . La lettre  $\alpha$  est alors codée par la lettre associée à  $\varphi(n)$ .

On ne connaît pas les entiers  $a$  et  $b$ , mais on sait que la lettre F est codée par la lettre K et la lettre T est codée par la lettre O.

- (a) Montrer que les entiers  $a$  et  $b$  sont tels que : 
$$\begin{cases} 5a + b \equiv 10 & \text{modulo } 26 \\ 19a + b \equiv 14 & \text{modulo } 26 \end{cases}$$
  - (b) En déduire qu'il existe un entier  $k$  tel que  $14a - 26k = 4$ .
  - (c) Déterminer tous les couples d'entiers  $(a, b)$ , avec  $0 \leq a \leq 25$  et  $0 \leq b \leq 25$ , tels que 
$$\begin{cases} 5a + b \equiv 10 & \text{modulo } 26 \\ 19a + b \equiv 14 & \text{modulo } 26 \end{cases}$$
3. On suppose que  $a = 17$  et  $b = 3$ .
    - (a) Coder le message « GAUSS ».
    - (b) Soit  $n$  et  $p$  deux entiers naturels quelconques. Montrer que, si  $\varphi(n) = \varphi(p)$ , alors  $17(n - p) \equiv 0 \pmod{26}$ .  
 En déduire que deux lettres distinctes de l'alphabet sont codées par deux lettres distinctes.
  4. On suppose que  $a = 17$  et  $b = 3$ .
    - (a) Soit  $n$  un entier naturel.  
 Calculer le reste de la division euclidienne de  $23\varphi(n) + 9 - n$  par 26.
    - (b) En déduire un procédé de décodage.
    - (c) En déduire le décodage du message « KTGZDO ».

**Exercice n° 27 (enseignement obligatoire)**

Un quincaillier achète des ampoules à trois fournisseurs dans les proportions suivantes : 20 % au premier fournisseur, 50 % au deuxième fournisseur et 30 % au troisième fournisseur.

Le premier fournisseur fabrique 97 % d'ampoules sans défaut, le deuxième fournisseur fabrique 98 % d'ampoules sans défaut, le troisième fournisseur fabrique 95 % d'ampoules sans défaut.

1. On choisit une ampoule au hasard dans le stock. On note  $D$  l'événement « l'ampoule est défectueuse »,  $F_1$  l'événement « l'ampoule provient du premier fournisseur »,  $F_2$  l'événement « l'ampoule provient du deuxième fournisseur » et  $F_3$  l'événement « l'ampoule provient du troisième fournisseur ».

(a) Calculer la probabilité de l'événement  $D$ , notée  $P(D)$ .

(b) Sachant que l'ampoule choisie est défectueuse, quelle est la probabilité  $P_D(F_1)$  qu'elle provienne du premier fournisseur ?

Donner la valeur exacte et une valeur approchée à  $10^{-3}$  près de  $P_D(F_1)$ .

2. On suppose que la probabilité qu'une ampoule soit sans défaut est de 0,969.

On monte 12 ampoules sur un lustre. Calculer la probabilité  $R$  qu'une ampoule au plus soit défectueuse.

On donnera une valeur approchée à  $10^{-3}$  près de  $R$ .

3. La durée de vie en heures d'une ampoule, notée  $T$ , suit une loi de durée de vie sans vieillissement (ou loi exponentielle) de paramètre  $\lambda = \frac{1}{50\,000} = 2 \cdot 10^{-5}$ .

Selon cette loi, pour tout  $x$  de  $[0, +\infty[$ ,  $P(T \leq x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt$ .

(a) Quelle est la probabilité  $P_1$  qu'une ampoule dure plus de 25 000 heures ? Donner la valeur exacte de  $P_1$ .

(b) Quelle est la probabilité  $P_2$  qu'une ampoule dure plus de 50 000 heures ? Donner la valeur exacte de  $P_2$ .

(c) Quelle est la probabilité  $P_3$  qu'une ampoule dure plus de 50 000 heures, sachant qu'elle a déjà duré 25 000 heures ? Donner la valeur exacte de  $P_3$ .

---



## Exercice n° 28 (enseignement obligatoire)

### PREMIÈRE PARTIE

On note  $j$  le nombre complexe  $e^{\frac{2i\pi}{3}}$ .

1. Montrer les propriétés suivantes de  $j$  :

(a)  $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ .

(b)  $j^3 = 1$ .

(c)  $1 + j + j^2 = 0$ .

(d)  $-j^2 = e^{i\frac{\pi}{3}}$ .

2. Dans un repère orthonormal direct du plan, on considère les points  $M, N, P$  d'affixes respectives  $m, n, p$ .

(a) Montrer que, si le triangle  $MNP$  est équilatéral direct, alors  $m - n = -j^2(p - n)$ .


(b) Établir la propriété suivante :

Le triangle  $MNP$  est équilatéral direct si, et seulement si,  $m + nj + pj^2 = 0$ .

### DEUXIÈME PARTIE

On considère un cercle du plan de centre  $O$  et des points  $A, B, C, D, E, F$  de ce cercle tels que les angles  $(\vec{OA}, \vec{OB})$ ,  $(\vec{OC}, \vec{OD})$ ,  $(\vec{OE}, \vec{OF})$  aient la même mesure  $\frac{\pi}{3}$ . Soit  $M, N, P$  les milieux respectifs des cordes  $[BC]$ ,  $[DE]$ ,  $[FA]$ .

Montrer que le triangle  $MNP$  est équilatéral direct.



## Exercice n° 29 (spécialité)

### Des nombres étranges !

Les nombres 1 ; 11 ; 111 ; 1111 *etc.* sont des nombres que l'on appelle rep-units (répétition de l'unité). Ils ne s'écrivent qu'avec des chiffres 1. Ces nombres possèdent de nombreuses propriétés qui passionnent des mathématiciens.

Cet exercice propose d'en découvrir quelques-unes.

Pour  $k$  entier strictement positif, on note  $N_k$  le rep-unit qui s'écrit à l'aide de  $k$  chiffres 1. Ainsi  $N_1 = 1$ ,  $N_2 = 11$ ,  $N_3 = 111$ , ...

1. Citer deux nombres premiers inférieurs à 10 n'apparaissant jamais dans la décomposition d'un rep-unit.

Justifier brièvement la réponse.

2. À quelle condition sur  $k$  le nombre 3 apparaît-il dans la décomposition du rep-unit  $N_k$  ?

Justifier brièvement la réponse.

3. Pour  $k \geq 1$ , le rep-unit  $N_k$  est défini par  $N_k = \sum_{i=0}^{k-1} 10^i = 1 + 10 + 10^2 + \dots + 10^{k-1}$ .

Justifier l'égalité :  $9N_k = 10^k - 1$  pour tout entier  $k \geq 1$ .

4. Le tableau ci-dessous donne les restes de la division par 7 de  $10^k$ , pour  $k$  entier compris entre 1 et 8.

$k$	1	2	3	4	5	6	7	8
Reste de la division de $10^k$ par 7	3	2	6	4	5	1	3	2

Soit  $k$  un entier strictement positif. Démontrer que :

$$\ll 10^k \equiv 1 \pmod{7} \gg \text{ équivaut à } \ll k \text{ est multiple de } 6 \gg.$$

En déduire que 7 divise  $N_k$  si et seulement si  $k$  est multiple de 6.

## Exercice n° 30 (spécialité)

### Des nombres étranges !

Les nombres  $1 ; 11 ; 111 ; 1111$  *etc.* sont des nombres que l'on appelle rep-units (répétition de l'unité). Ils ne s'écrivent qu'avec des chiffres 1. Ces nombres possèdent de nombreuses propriétés qui passionnent des mathématiciens.

Cet exercice propose d'en découvrir quelques unes.

Pour  $k$  entier strictement positif, on note  $N_k$  le rep-unit qui s'écrit à l'aide de  $k$  chiffres 1.

Ainsi  $N_1 = 1$ ,  $N_2 = 11$ ,  $N_3 = 111$ , ...

1. Citer deux nombres premiers inférieurs à 10 n'apparaissant jamais dans la décomposition d'un rep-unit.  
Justifier brièvement la réponse.
  2. Donner la décomposition en facteurs premiers de  $N_3$ ,  $N_4$  et  $N_5$ .
  3. Soit  $n$  un entier strictement supérieur à 1. On suppose que l'écriture décimale de  $n^2$  se termine par le chiffre 1.
    - (a) Montrer que, dans son écriture décimale,  $n$  se termine lui-même par 1 ou par 9.
    - (b) Montrer qu'il existe un entier  $m$  tel que  $n$  s'écrive sous la forme  $10m + 1$  ou  $10m - 1$ .
    - (c) En déduire que  $n^2 \equiv 1 \pmod{20}$ .
  4.
    - (a) Soit  $k \geq 2$ . Quel est le reste de la division de  $N_k$  par 20 ?
    - (b) En déduire qu'un rep-unit distinct de 1 n'est pas un carré.
-

### Exercice n° 31 (enseignement obligatoire)

L'espace est rapporté à un repère orthonormal  $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ . On étudie le tétraèdre  $OABC$ , où les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  sont définis par leurs coordonnées :  $A(0, 0, 2)$ ,  $B(\sqrt{3}, 1, 0)$  et  $C(\sqrt{3}, -1, 0)$ .

#### Partie A. Géométrie analytique dans un tétraèdre

- Faire une figure représentant le repère et le tétraèdre.
  - Déterminer la nature géométrique et calculer les dimensions de chacune des faces du tétraèdre.
- On considère le vecteur  $\vec{u}$  de coordonnées  $(2, 0, \sqrt{3})$ .
  - Vérifier que le vecteur  $\vec{u}$  est normal au plan  $(ABC)$ .
  - En déduire une équation du plan  $(ABC)$ .

#### Partie B. Étude d'une section plane

Soit  $J$  le milieu de l'arête  $[BC]$ . Le point  $N$  est un point mobile du segment  $[OJ]$ . On appelle  $(P)$  le plan passant par le point  $N$  et orthogonal à la droite  $(OJ)$ .

- On pose  $t = ON$ . Vérifier que  $t$  appartient à l'intervalle  $[0, \sqrt{3}]$ .
- On se propose de déterminer la nature de la section plane du tétraèdre  $OABC$  par le plan  $(P)$ . Le plan  $(P)$  coupe :
  - l'arête  $[OC]$  au point  $R$ ;
  - l'arête  $[AC]$  au point  $S$ ;
  - l'arête  $[AB]$  au point  $T$ ;
  - l'arête  $[OB]$  au point  $U$ .
  - Démontrer que les droites  $(ST)$ ,  $(BC)$  et  $(RU)$  sont parallèles. Démontrer que les droites  $(RS)$ ,  $(OA)$  et  $(TU)$  sont parallèles.
  - Démontrer que le quadrilatère  $RSTU$  est un rectangle.
  - Déterminer avec soin les dimensions du rectangle  $RSTU$  en fonction du nombre réel  $t$  (on précisera en particulier les différents triangles dans lesquels sont menés les calculs).
- Soit  $S(t)$  l'aire de la section plane définie à la question B. 2. Démontrer que  $S(t) = \frac{4}{3}t(\sqrt{3} - t)$ .
  - Étudier les variations de la fonction  $S$ , définie sur l'intervalle  $[0, \sqrt{3}]$  par  $S(t)$ .
  - Pour quelle valeur du nombre réel  $t$  l'aire  $S(t)$  est-elle maximale ? Quelle est alors la nature géométrique particulière de la section plane étudiée ?
- On rappelle que le volume  $V$  du tétraèdre  $OABC$  est égal à l'intégrale  $\int_0^{\sqrt{3}} S(t) dt$ . Calculer  $V$  par cette méthode.
  - Calculer  $V$  en utilisant l'aire d'une face et la hauteur correspondante du tétraèdre.
  - Vérifier la cohérence des deux résultats.